



HEPATOLOJİDE BU HAFTA

Eylül 2020 Sayı 3

Hazırlayan: Dr. Gökhan KABAÇAM

**1. Sirolimus Kullanan Karaciğer Nakli Alıcılarında Immunosupresif Kesilmesi.**  
Immunosuppression Withdrawal in Liver Transplant Recipients on Sirolimus.

Levitsky, J., Burrell, B.E., Kanaparthi, S., et al.

Hepatology, (2020), 72: 569-583.

doi:[10.1002/hep.31036](https://doi.org/10.1002/hep.31036)

M-TOR-inhibitörü monoterapisi alan karaciğer nakli alıcılarında ortalama 6,7 yıldan sonra tedavi kesilmiş ve %53'ünde operasyonel tolerans saptanmıştır. Geri kalan 7 olgudan 6'sında akut rejeksiyon gelişmiştir. Toleransı olan olguları saptamak için ilaç kesilmesi öncesi gen ekspresyonu ve PBMC profili analizinin prediktif olabileceği saptanmıştır.

Hazırlayan: Dr. Gökhan KABAÇAM

**2. Von Willebrand Faktörü MELD skorunu iyileştirmektedir – Karaciğer Nakli Bekleme Listesinde Bağımsız Risk Stratifikasyonu.**

The von Willebrand Factor Facilitates Model for End-Stage Liver Disease–Independent Risk Stratification on the Waiting List for Liver Transplantation.

Györi, G.P., Pereyra, D., Rumpf, B., et al.

Hepatology, (2020), 72: 584-594.

doi:[10.1002/hep.31047](https://doi.org/10.1002/hep.31047)

Karaciğer Nakli için listeleme sırasında yapılacak tek bir vWF ölçümü erken dönem mortalite için belirleyicidir. MELD – Na ile vWF-Antijen seviyesinin kombine edilmesi, risk stratifikasyonunu iyileştirir ve bekleme listesi mortalitesinin düzelmesine katkıda bulunur (AUC=0.804).

Bu bülten Türk Karaciğer Araştırmaları Demeği (TKAD) tarafından, bilimsel gelişime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Makalelerin içeriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluğu ilgili yazar ve yayınevlerine aittir. Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir şekilde demek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir. TKAD adına sahibi: Ramazan İdilman (Başkan) Bülten editörü: Arif Mansur Coşar