



HEPATOLOJİDE BU HAFTA

Kasım 2020 Sayı 4

Hazırlayan: Dr. Gökhan KABAÇAM

1. 2012'den 2017'ye Kronik Karaciğer Hastalıkları Global Dağılımında Değişimler: NAYK'ın Büyüyen Etkisi.

Changes in the Global Burden of Chronic Liver Diseases From 2012 to 2017: The Growing Impact of NAFLD.

Paik, J.M., Golabi, P., Younossi, Y., et al.
Hepatology, (2020), 72: 1605-1616.

<https://doi.org/10.1002/hep.31173>

2012'den 2017'ye kadar geçen sürede karaciğer ilişkili ölüm sıklığında % 11.4'lük artış izlenmiştir. NAYK ve Alkolik Karaciğer Hastalığı yıllık olarak % 1.42 ve %0.53 oranında artarken HBV ve HCV'de artış izlenmemiştir. Viral hepatitler halen karaciğer ilişkili ölümün en sık nedeni olmasına rağmen NAYK en hızlı artan karaciğer ilişkili morbidite ve mortalite nedenidir.

Bu bülten Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından, bilimsel gelişime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Makalelerin içeriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluğu ilgili yazar ve yayınevlerine aittir. Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir şekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir. TKAD adına sahibi: Ramazan İdilman (Başkan) Bülten editörü: Arif Mansur Coşar