



HEPATOLOJİDE BU HAFTA

Ocak 2020 Sayı 3

Hazırlayan: Dr. Gökhan KABAÇAM

1. Kronik Hepatit B'li olgularda Non-Alkolik Steatohepatit karaciğere bağlı sonuçları ve tüm nedenlere bağlı ölümü etkilemektedir.

Avrupa ve Amerika'dan 2 merkezden binden fazla olgunun 13 yıl süreyle izlendiği çalışmada, NASH ve KHB birlikteliği olan olgularda tek başına KHB'ye göre daha fazla ileri fibrozis, daha kısa sürede karaciğere bağlı komplikasyonlar ve ölüm olduğu saptanmıştır. İleri fibrozisi olan olgularda NASH'in tabloya eklenmesi kötü seyirle ilişkili bulunmuştur.

Choi HSJ, Brouwer WP, Zanfir WMR, et al.

Nonalcoholic Steatohepatitis Is Associated With Liver-Related Outcomes and All-Cause Mortality in Chronic Hepatitis B.


Hepatology. 2020 Feb;71(2):539-548.

[doi: 10.1002/hep.30857.](https://doi.org/10.1002/hep.30857)

Hazırlayan: Dr. Hüseyin Savaş Göktürk

2-) Karaciğer dışı kanserler ve Kronik Hepatit C Enfeksiyonu

Kronik Hepatit C Enfeksiyonu, hem karaciğer hem de karaciğer dışı belirti ve bulgular ile seyreden sistemik bir enfeksiyondur. Tüm dünyada, kanserlerin yaklaşık %15'i HCV gibi enfeksiyöz ajanlarla ilişkilidir. Bu derlemede, kronik Hepatit C ile karaciğer dışı kanserler tartışılmıştır.



Pol, S., Vallet-Pichard, A. & Hermine, O.

Extrahepatic cancers and chronic HCV infection.

Nat Rev Gastroenterol Hepatol 15, 283–290 (2018)

<https://doi.org/10.1038/nrgastro.2017.172>

Bu bülten Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından, bilimsel gelişime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Makalelerin içeriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluğu ilgili yazar ve yayınevlerine aittir. Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir şekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir.

TKAD adına sahibi: Ramazan İdilman (Başkan)

Bülten editörü: Arif Mansur Coşar