



Hazırlayan: Dr. H. Savaş Göktürk

Rezeksiyon sonrası HCC nüksünü öngörmede karaciğer ve dalak sertliği (stiffness) ölçümünün rolü


Role of liver and spleen stiffness in predicting the recurrence of hepatocellular carcinoma after resection

Marasco, Giovanni et al.

Journal of Hepatology, Article in Press

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.10.022>

HCC rezeksiyonu sonrası erken nüksün (< 24 ay) genellikle tümör ve tedavi ilişkili faktörlere bağlı olduğu bilinirken geç nüksün belirteçleri konusunda fazla bir mevcut değildir. 175 HCC hastasının rezeksiyon sonrası en az 30 ay veya nükse kadar izlendiği bu çalışmaya göre: Geç nüks en çok karaciğer hastalığının ve portal hipertansiyonun şiddeti ile ilişkilidir ve dalak sertlik (stiffness) ölçümü bunun en önemli göstergesidir.



Hazırlayan: Dr. H. Savaş Göktürk

Primer Bilier Kolanjit (PBC): Yeni rehberler yayınlandı

Primary Biliary Cholangitis: 2018 Practice Guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases.

Lindor, K. D., Bowlus, C. L., Boyer, J., Levy, C. and Mayo, M.

(2019), Hepatology, 69: 394-419.

doi:10.1002/hep.30145

Diagnosis and Management of Primary Biliary Cholangitis

Younossi, Zobair M., MD, et al.

American Journal of Gastroenterology: January 2019 - Volume 114 - Issue 1 - p 48-63

doi: 10.1038/s41395-018-0390-3

Hepatoloji Dergisi Ocak 2019 sayısında AASLD rehberi olarak ve American Journal of Gastroenterology Dergisi Ocak 2019 sayısında da Chronic Liver Disease Foundation (CLDF), rehberi olarak yayınlandı.

Bu bülten Türk Karaciğer Arařtırmaları Derneđi (TKAD) tarafından, bilimsel geliřime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Makalelerin ieriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluđu ilgili yazar ve yayınevlerine aittir. Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir řekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir.

TKAD adına sahibi: Ramazan İdilman (Bařkan)

Bülten editörü: Arif Mansur Cořar

www.tasl.org.tr