



Hazırlayan: Dr. Gökhan KABAÇAM

Bilier Atrezide Serum Matrix Metalloproteinaz – 7'nin Tanısal Doğruluğu

Diagnostic Accuracy of Serum Matrix Metalloproteinase-7 for Biliary Atresia

Yang, L. , Zhou, Y. , Xu, P. , et al.
Hepatology, (2018), 68: 2069-2077.
doi:10.1002/hep.30234

Bilier Atrezi tanısı ve diğer neonatal kolestaz nedenlerinden ayırt edilmesinde serum MMP – 7 ölçümünün hassasiyeti % 98.6 ve özgüllüğü % 95'tir. Eşik değeri 52,85ng/mL'dir (AUC = 0,9900)

Hazırlayan: Dr. Gökhan KABAÇAM

Non – Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığında sağlık hizmet sunum maliyeti ve kullanımı: Geniş ABD Veri - tabanından gerçek yaşam verisi

Healthcare Cost and Utilization in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Real-World Data From a Large U.S. Claims Database.

Allen, A. M., Houten, H. K., Sangaralingham, L. R., et al.
Hepatology, (2018), 68: 2230-2238.
doi:10.1002/hep.30094

NAYK Hastalığının maliyeti özellikle de ilk tanı döneminde, metabolik komorbiditelerinkinden bağımsız olarak çok fazladır. Maliyeti artıran faktörlerin araştırılması ve daha maliyet – etkin tanısal testlerin geliştirilmesi gereklidir.

Bu bülten Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından, bilimsel gelişime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Makalelerin içeriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluğu ilgili yazar ve yayıncularına aittir. Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir şekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir.

TKAD adına sahibi: Ramazan İdilman (Başkan)

Bülten editörü: Arif Mansur Coşar