



Hazırlayan: Dr. H. Savaş Göktürk

Karaciğer transplantasyonu öncesi yapılan değerlendirmede saptanan koroner arter hastalığı (KAH) tedavisinde Aspirin ve Statin kullanımı

Utilization of aspirin and statin in management of coronary artery disease in patients with cirrhosis undergoing liver transplant evaluation

Patel, S. Et al. *Liver Transpl*, 24: 872-880. 2018
DOI: <https://doi.org/10.1002/lt.25067>

Koroner arter hastalığının standart tedavisinde aspirin ve statinler yer almasına rağmen, sirotik bir koroner arter hastasında çeşitli çekinceler nedeniyle daha az kullanıldığı bilinmektedir. Bu ilaçların hepatik dekompanseasyon, renal fonksiyonlar, GİS kanama ve transfüzyon ihtiyacına etkileri araştırılan bu çalışmaya göre: Statin ve aspirin kullanımı güvenlidir

Hazırlayan: Müjdat Zeybel

Alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı için yüksek genetik riski olan bireylerde beslenme kalitesinin artırılması karaciğer yağ miktarını azaltmaktadır.

Jiantao Ma, Rachel Hennein, Chunyu Liu, et al.
Gastroenterology
July 2018, Volume 155, Issue 1, Pages 107–117

DOI: <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2018.03.038>

Framingham Kalp çalışmasından 1521 katılımcı ile yapılan çalışmada Akdeniz diyeti ile beslenme azaldıkça karaciğer yağ miktarı artmıştır. Bu etki özellikle yüksek genetik riski olan bireylerde (tek gen polimorfizmleri) daha belirgin olarak izlenmiştir.

Bu bülten Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından, bilimsel gelişime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Makalelerin içeriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluğu ilgili yazar ve yayınevlerine aittir. Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir şekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir.

TKAD adına sahibi: Ramazan İdilman (Başkan)

Bülten editörü: Arif Mansur Coşar