



Hazırlayan: Prof.Dr Hüseyin Savaş Göktürk

## HCV infekte hastalarda Trisiklik Antidepresan (TCA) kullanımı ve fibrozis progresyon riski

*Tenofovir vs placebo to prevent perinatal transmission of hepatitis B*  
Chen JY, et al. *J Viral Hepat.* 2018;00:1-9.  
<https://doi.org/10.1111/jvh.12884>

Prelinik çalışmalarda trisiklik antidepresanların (TCA) antifibrotik etkileri olabileceğinin öne sürülmesini temel alana bu elektronik veritabanını kullanılarak yapılan değerlendirmeye göre:

- TCA kullanan HCV infekte hastalarda fibrozis progresyonu da siroz gelişimi de daha az olmaktadır.

Hazırlayan: Prof.Dr Hüseyin Savaş Göktürk

## Kemoterapi alan kanser hastalarında profilaktik entekavir (ETV) ve tenofovir (TDF) kullanımını sonrası HBV nüksünde HBsAg'nin rolü

*The role of HBsAg in HBV relapse after entecavir or tenofovir prophylaxis in patients undergoing cancer chemotherapy.*  
Kuo, M.-T., et al. *Journal of Gastroenterology and Hepatology.*  
doi: 10.1111/jgh.14142.

Kanser tedavisi için kemoterapi alan, bununla birlikte profilaktif ETV veya TDF kullanan 122 HBsAg negatif hastanın takip edildiği çalışmanın sonuçlarına:

- HBV DNA < 2000 IU/mL olan hastalarda tedavi sonu HBsAg >500 IU/mL olması nüksün tahmininde önemli belirteçtir.

Bu bülten Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından, bilimsel gelişime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Makalelerin içeriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluğu ilgili yazar ve yayıncularına aittir. Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir şekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir.

**TKAD adına sahibi:** Ramazan İdilman (Başkan)

**Bülten editörü:** Arif Mansur Coşar