



Hazırlayan: Dr. H. Savaş Göktürk

Otoimmün Hepatit (OİH) tedavisinde Predniso(lo)ne dozu ve remisyon oranları

Predniso(lo)ne Dosage and Chance of Remission in Patients With Autoimmune Hepatitis
Pape, Simon et al.
Clinical Gastroenterology and Hepatology, Article in Press
DOI: Henüz tanımlanmamış.

EASL OİH rehberinde OİH tedavisinde indüksiyon aşamasında Predniso(lo)ne dozunu 0,5-1mg/kg/gün olarak önermektedir. Klinik uygulamada çok değişik dozlarda kullanım mevcuttur. Beş Avrupa ülkesinden 9 merkezden toplam 451 hastanın retrospektif değerlendirildiği bu çalışmanın sonucuna göre: <0,5 mg/kg/gün dozunda predniso(lo)ne kullanımı ile > 1 mg/kg/gün dozunda kullanım arasında anlamlı bir fark saptanamamış.

Hazırlayan: Dr. H. Savaş Göktürk

Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Hastalığı (NAFLD) Obez olmayan kadınlarda Meme Ca ile ilişkilidir

Nonalcoholic fatty liver disease is associated with breast cancer in nonobese women
Kwak, Min-Sun et al.
Digestive and Liver Disease
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dld.2018.12.024>

Meme Ca tanısı alan 270 hastanın ve 270 kontrolün dahil edildiği bu vaka-kontrol çalışması sonucuna göre: **NAFLD varlığı obez olmayan kadınlarda meme Ca için bir risk faktörüken aynı bağlantı obez kadınlarda saptanamamış.**

Bu bülten Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından, bilimsel gelişime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır. Makalelerin içeriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluğu ilgili yazar ve yayınevlerine aittir. Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir şekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir.

TKAD adına sahibi: Ramazan İdilman (Başkan)

Bülten editörü: Arif Mansur Coşar