



Mart 2023 Sayı 4

Hazırlayan: Dr Savaş Göktük


Yağlı Karaciğer Hastalığı isimlendirmesinde yeni uzlaşma bildirisi

A multi-society Delphi consensus statement on new fatty liver disease nomenclature

Hepatology:10.1097/ June 24, 2023.

DOI: 10.1097/HEP.0000000000000520

Bir hastalığın tanımlanması ve isimlendirilmesi, hastalığın küresel ölçekte farkındalığının artmasında, risk gruplarının saptanmasında ve tanı ve tedaviye etkin şekilde ulaşmada önemli rol oynamaktadır. 56 ülkeden 236 panelistin katılımıyla (Türkiye'den Prof. Dr. Yusuf Yılmaz) Yağlı Karaciğer Hastalığı için yeni bir isimlendirme ve tanı kriterleri konusunda bir uzlaşma bildirisi hazırlanmış ve geniş kapsamlı kabul görmüştür. (Örn. NAFLD yerine MASLD-Metabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease)



*Cardiometabolic criteria

Adult Criteria	Pediatric Criteria
At least 1 out of 5: <input type="checkbox"/> BMI ≥ 25 kg/m ² [23 Asia] OR WC > 94 cm (M) 80 cm (F) OR ethnicity adjusted <input type="checkbox"/> Fasting serum glucose ≥ 5.6 mmol/L [100 mg/dL] OR 2-hour post-load glucose levels ≥ 7.8 mmol/L [≥ 140 mg/dL] OR HbA1c $\geq 5.7\%$ [39 mmol/L] OR type 2 diabetes OR treatment for type 2 diabetes <input type="checkbox"/> Blood pressure $\geq 130/85$ mmHg OR specific antihypertensive drug treatment <input type="checkbox"/> Plasma triglycerides ≥ 1.70 mmol/L [150 mg/dL] OR lipid lowering treatment <input type="checkbox"/> Plasma HDL-cholesterol ≤ 1.0 mmol/L [40 mg/dL] (M) and ≤ 1.3 mmol/L [50 mg/dL] (F) OR lipid lowering treatment	At least 1 out of 5: <input type="checkbox"/> BMI $\geq 85^{\text{th}}$ percentile for age/sex [BMI \geq score $\geq +1$] OR WC $> 95^{\text{th}}$ percentile OR ethnicity adjusted <input type="checkbox"/> Fasting serum glucose ≥ 5.6 mmol/L [≥ 100 mg/dL] OR serum glucose ≥ 11.1 mmol/L [≥ 200 mg/dL] OR 2-hour post-load glucose levels ≥ 7.8 mmol [140 mg/dL] OR HbA1c $\geq 5.7\%$ [39 mmol/L] OR already diagnosed/treated type 2 diabetes OR treatment for type 2 diabetes <input type="checkbox"/> Blood pressure age $< 13y$, BP $\geq 95^{\text{th}}$ percentile OR $\geq 130/80$ mmHg (whichever is lower); age $\geq 13y$, 130/85 mmHg OR specific antihypertensive drug treatment <input type="checkbox"/> Plasma triglycerides $< 10y$, ≥ 1.15 mmol/L [≥ 100 mg/dL]; age $\geq 10y$, ≥ 1.70 mmol/L [≥ 150 mg/dL] OR lipid lowering treatment <input type="checkbox"/> Plasma HDL-cholesterol ≤ 1.0 mmol/L [≤ 40 mg/dL] OR lipid lowering treatment

Bu bülten Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) tarafından, bilimsel gelişime katkı amacı ile hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.

Makalelerin içeriklerinin tıbbi ve hukuki sorumluluğu ilgili yazar ve yayınevlerine aittir.

Paylaşılması istenen güncel makalelerin, formata uygun bir şekilde dernek e-posta adresine (tasl@tasl.org.tr) yollanması gerekmektedir.

TKAD adına sahibi: Fulya Günşar (Başkan)

Bülten editörü: Arif Mansur Coşar